

IMPORTANT MEDICAL INFO



**THIS PATIENT LACKS PARATHYROID HORMONE
AND IS AT RISK FOR HYPOCALCEMIC AND
HYPERCALCEMIC CRISES.**

In case of serious illness, nausea, vomiting and/or cramps, check serum calcium and kidney function.

If hypocalcemia and tetany, administer i.v. 2.5-5 mmol calcium chloride or gluconate (~ 100-200 mg elemental calcium) in 100 mL saline or glucose solution over 10 min. Repeat if needed.

If hypercalcemia > 3.5 mmol/L (14.0 mg/dL), administer saline intravenously and admit the patient immediately to hospital.

Name/ Nume

Date of birth/ Data nașterii



European Society
of Endocrinology

INFORMAȚII MEDICALE IMPORTANTE



**ACEST PACIENT ARE LIPSĂ DE HORMON
PARATIROIDIAN ȘI PREZINTĂ RISCUL DE A FACE
CRIZE HIPOCALCEMICE ȘI HIPERCALCEMICE.**

În caz de stare generală modificată, greață, vărsături și/
sau crampe, vă rugăm să verificați calciul seric și funcția
rinichilor.

În hipocalcemie și tetanie, administrați i.v. 2,5-5 mmol
clorură de calciu sau gluconat (~ 100-200 mg calciu
elemental) în 100 mL soluție salină sau glucoză timp de
10 min. Repetați dacă este necesar.

Dacă hipercalemia este $> 3,5$ mmol/L
(14,0 mg/dL), administrați ser fiziologic intravenos și
internați pacientul imediat în spital.

Societatea Română de Endocrinologie
Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie